



FROM | arkansas
health & wellness™



Guía de atención preventiva

EN VIGENCIA DESDE EL 1.º DE ENERO DE 2026

Guía de atención preventiva

Descripción general (requisitos federales de atención preventiva): La Ley de Cuidado de Salud Asequible (PPACA) federal exige que los planes de salud sin derechos adquiridos cubran determinados servicios de atención preventiva sin costo compartido para el miembro cuando los preste un proveedor de la red. Esta cobertura incluye:

- Artículos o servicios basados en la evidencia que tienen en vigor una calificación de “A” o “B” en las recomendaciones actuales del Grupo Especial de Servicios Preventivos de los Estados Unidos (USPSTF).
 - Para consultar las recomendaciones A/B publicadas del USPSTF, visite:
<https://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/recommendation-topics/uspstf-a-and-b-recommendations>.
- Vacunas para uso de rutina en niños, adolescentes y adultos que tienen en vigor una recomendación del Comité Asesor sobre Prácticas de Vacunación (ACIP) de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).
 - Para consultar los calendarios de vacunación publicados recomendados por el ACIP, visite:
<https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/imz-schedules/index.html>
- Con respecto a los bebés, los niños y los adolescentes, la atención preventiva basada en la evidencia y los exámenes previstos en las pautas integrales que respalda la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA). La HRSA respalda las pautas preventivas establecidas por la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP) para la salud y el bienestar de bebés, niños y adolescentes. A estas recomendaciones se las conoce como “Bright Futures”.
 - Para consultar las recomendaciones Bright Futures publicadas, visite:
https://downloads.aap.org/AAP/PDF/periodicity_schedule.pdf
- En el caso de las mujeres, la atención preventiva y los exámenes adicionales según se establece en las pautas integrales que respalda la HRSA.
 - Para consultar las recomendaciones publicadas de la HRSA (para mujeres), visite:
<https://www.hrsa.gov/womens-guidelines>

Aviso: La cobertura de los servicios de atención preventiva debe entrar en vigor en la fecha de inicio o aniversario de un plan que sea un año posterior a la fecha de publicación de una nueva recomendación o pauta.

La PPACA establece que se pueden usar técnicas razonables de administración médica para determinar las limitaciones de cobertura si una recomendación o pauta no especifica la frecuencia, el método, el tratamiento o el entorno para la prestación de un servicio preventivo recomendado. Las técnicas razonables de administración médica pueden incluir la autorización previa, la revisión simultánea, la revisión de reclamaciones o prácticas similares para determinar las limitaciones de cobertura en virtud del plan. Estas técnicas y prácticas razonables de administración médica establecidas pueden utilizarse para determinar la frecuencia, el método, el tratamiento o el entorno para la prestación de un servicio preventivo recomendado.

Además de los servicios designados identificados por las fuentes mencionadas, el tratamiento para dejar de fumar, los exámenes de bienestar para todas las poblaciones (niños y adultos) y los servicios que son una parte integral de los beneficios específicos de atención preventiva (por ejemplo, la anestesia administrada durante la cirugía de esterilización para mujeres) están incluidos en la cobertura de atención preventiva.

Cobertura de atención preventiva de Ambetter Health: Todos los planes de Ambetter Health proporcionan cobertura de atención preventiva de acuerdo con los requisitos de la PPACA mencionados anteriormente. Si dos recomendaciones abordan el mismo beneficio, pero son diferentes (por ejemplo, la recomendación de examen de detección de cáncer de seno del USPSTF frente a la recomendación de examen de detección de cáncer de seno de la HRSA), se aplica la cobertura más completa. **Si bien esta documentación solo se enfoca en los requisitos federales (cobertura nacional de atención preventiva), cubrimos beneficios adicionales de atención preventiva cuando lo exige la ley estatal.**

La atención preventiva se refiere a las medidas o servicios adoptados para promover la salud y la prevención o detección temprana de enfermedades y lesiones, en lugar de tratarlas o curarlas. La atención preventiva puede incluir, entre otros, exámenes y pruebas de detección adaptados a la edad, la salud y los antecedentes familiares de cada persona. Toda la atención preventiva recibida de un proveedor de Ambetter Health dentro de la red está cubierta sin costo compartido (es decir, cubierta al 100% (del monto contratado), sin deducible, coseguro ni copago). Esta cobertura también incluye los medicamentos recetados preventivos como los anticonceptivos, la aspirina, la vitamina D y el ácido fólico para todas las personas que planean quedar embarazadas o que podrían hacerlo. El Formulario (lista de medicamentos recetados) puede proporcionar detalles adicionales sobre los medicamentos específicos cubiertos sin costos compartidos.

Tenga en cuenta que determinados servicios cubiertos pueden prestarse por motivos preventivos o de diagnóstico. Cuando un servicio preventivo cubierto se presta con el objetivo de realizar un examen preventivo y se notifica correctamente (es facturado por el proveedor), se considerará incluido en el beneficio de servicios de atención preventiva. Ejemplos de servicios preventivos son los realizados a una persona que cumple con alguna de las siguientes características:

- Nunca antes se realizó el examen preventivo y no presenta síntomas ni otros estudios anormales que sugieran anomalías.
- Se realizó un examen preventivo dentro del intervalo recomendado y se consideró que los resultados eran normales.
- Se realizó servicios de diagnóstico con resultados que fueron normales, después de lo cual el médico recomendó realizar futuros exámenes preventivos usando los intervalos de servicios preventivos.

Sin embargo, cuando un servicio cubierto se realiza con fines de diagnóstico, no se incluirá en la atención preventiva, sino en el beneficio médico no preventivo correspondiente, para el que podría aplicarse un costo compartido (deducible, coseguro o copago), en función de su plan. Ejemplos de servicios de diagnóstico son los realizados a una persona que cumple con alguna de las siguientes características:

- Le detectaron anomalías en estudios preventivos o de diagnóstico previos que requieren más estudios de diagnóstico.
- Le detectaron anomalías en estudios preventivos o de diagnóstico previos para las cuales se recomendaría la repetición de los mismos estudios en intervalos de tiempo reducidos respecto a los intervalos de tiempo recomendados para exámenes preventivos.
- Presentaba síntomas que requerían un diagnóstico más exhaustivo.
- No pertenece a la población aplicable para una recomendación o pauta.

El siguiente cuadro (que comienza en la página 3) ofrece una descripción general de la cobertura de atención preventiva disponible. IMPORTANTE: Si se recomienda un servicio de atención preventiva para un sexo específico (por ejemplo, hombres o mujeres), se hace en referencia al sexo de asignación de la persona, y no a la identidad de género.

Siglas:

- | | |
|---|--|
| •AAP: Academia Americana de Pediatría | •MMEP: Política de gastos médicos por servicios de mayor complejidad |
| •ACIP: Comité Asesor sobre Vacunas para el Paciente | •PPACA: Prácticas de la Ley de Cuidado de Salud Asequible |
| | •USPSTF: Grupo Especial de Servicios Preventivos de los Estados Unidos |
| •CDC: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades | |
| •EOC: Evidencia de Cobertura | •WPSI: Iniciativa de Servicios Preventivos para la Mujer |
| •HRSA: Administración de Recursos y Servicios de Salud | |

Preguntas de miembros: Si tiene preguntas sobre la cobertura de atención preventiva, hable con su médico directamente o llámenos al número gratuito que figura al dorso de su tarjeta de identificación (ID) de Ambetter Health.

SERVICIOS DE ATENCIÓN PREVENTIVA (recién nacidos, niños, adolescentes y adultos)

Servicio	Población	Resumen
Exámenes de bienestar	Niños y adultos	<p>Los servicios integrales de evaluación y administración de medicina preventiva (es decir, exámenes de bienestar) para los controles de bienestar de bebés, niños y adultos o mujeres incluyen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Historial adecuado a la edad y el género. • Examen físico. • Asesoramiento u orientación anticipada. • Intervenciones para reducir el factor de riesgo. • El pedido de las vacunas y los procedimientos de laboratorio o exámenes apropiados. <p><i>Aviso: Los servicios enumerados a continuación pueden prestarse como parte de un examen de bienestar o en un encuentro separado.</i></p>
Recomendaciones A/B del USPSTF		
Examen de aneurisma aórtico abdominal	Hombres	<p>Calificación del USPSTF (diciembre de 2019): B El USPSTF recomienda 1 examen de aneurisma aórtico abdominal con ultrasonografía por única vez en hombres de entre 65 y 75 años que hayan fumado alguna vez.</p>
Examen de detección de ansiedad en niños y adolescentes	Niños y adolescentes	<p>Calificación del USPSTF (octubre de 2022): B El USPSTF recomienda el examen para detectar ansiedad en niños y adolescentes de entre 8 y 18 años.</p>
Uso de aspirina para prevenir la preeclampsia y la morbilidad y mortalidad relacionadas	Mujeres embarazadas	<p>Calificación del USPSTF (septiembre de 2021): B El USPSTF recomienda el uso de aspirina de dosis baja (81 mg/día) como medicamento preventivo después de las 12 semanas de gestación en personas con riesgo alto de preeclampsia.</p>
Examen de detección de bacteriuria	Mujeres embarazadas	<p>Calificación del USPSTF (septiembre de 2019): B El USPSTF recomienda el examen para detectar bacteriuria asintomática mediante urocultivo en las personas embarazadas.</p>
Asesoramiento de salud del comportamiento para prevenir infecciones de transmisión sexual	Adolescentes y adultos	<p>Calificación del USPSTF (agosto de 2020): B El USPSTF recomienda el asesoramiento de salud del comportamiento para todos los adolescentes sexualmente activos y para los adultos con mayor riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual (STI).</p>
Asesoramiento de salud del comportamiento para prevenir el cáncer de piel	Niños, adolescentes, jóvenes adultos y padres de niños pequeños	<p>Calificación del USPSTF (marzo de 2018): B El USPSTF recomienda asesorar a los jóvenes adultos, adolescentes, niños y padres de niños pequeños sobre cómo minimizar la exposición a la radiación ultravioleta (UV) en personas de 6 meses a 24 años de edad con tipos de piel clara para reducir el riesgo de cáncer de piel.</p>
Examen de detección de cáncer de seno	Mujeres	<p>Calificación del USPSTF (abril de 2024): B El USPSTF recomienda una mamografía cada dos años para mujeres de entre 40 y 74 años.</p>

SERVICIOS DE ATENCIÓN PREVENTIVA (recién nacidos, niños, adolescentes y adultos)

Servicio	Población	Resumen
		Aviso: Consulte también la <u>recomendación sobre el examen de detección de cáncer de seno de la HRSA</u> en la página 10; en ella se aborda una cobertura más completa (con una frecuencia anual).
Examen de detección de cáncer cervical	Mujeres	<p>Calificación del USPSTF (agosto de 2018): A El USPSTF recomienda el examen para detectar cáncer cervical cada 3 años con citología cervical sola en mujeres de entre 21 y 29 años.</p> <p>Para las mujeres de entre 30 y 65 años, el USPSTF recomienda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Examen cada 3 años con citología cervical (examen de Papanicolaou) sola. • Cada 5 años solo con la prueba del virus del papiloma humano de alto riesgo (hrHPV). • Cada 5 años con la prueba hrHPV combinada con la citología (prueba conjunta).
Examen de detección de infección por clamidía	Mujeres	<p>Calificación del USPSTF (septiembre de 2021): B El USPSTF recomienda el examen para detectar clamidía en todas las mujeres sexualmente activas de 24 años o menos y en las mujeres de 25 años o más que presenten un mayor riesgo de infección. Esta recomendación se aplica a personas adolescentes y adultas asintomáticas sexualmente activas, incluidas las personas embarazadas.</p>
Examen de colesterol (examen de trastornos lipídicos)/uso de estatinas para la prevención primaria de enfermedades cardiovasculares en adultos	Adultos	<p>Calificación del USPSTF (agosto de 2022): B El USPSTF recomienda que los adultos sin antecedentes de enfermedad cardiovascular (CVD) usen una dosis baja a moderada de estatina para la prevención de episodios de CVD y mortalidad cuando se cumplan todos los siguientes criterios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tienen entre 40 y 75 años de edad. • Tienen 1 o más factores de riesgo de CVD (como dislipidemia, diabetes, hipertensión o tabaquismo). • Tienen un riesgo calculado a 10 años de sufrir un episodio cardiovascular igual o superior al 10%. <p>Aviso: La identificación de la dislipidemia y el cálculo del riesgo de CVD a 10 años requieren un examen general de lípidos en adultos de entre 40 y 75 años.</p>
Examen de detección de cáncer colorrectal	Adultos	<p>Calificación del USPSTF (mayo de 2021): B El USPSTF recomienda el examen para detectar cáncer colorrectal en adultos de entre 45 y 49 años.</p> <p>Calificación del USPSTF (mayo de 2021): A El USPSTF recomienda el examen para detectar cáncer colorrectal en todos los adultos de entre 50 y 75 años. Hay varios exámenes de detección recomendados disponibles. Los médicos y los pacientes pueden tener en cuenta diversos factores a la hora de decidir qué método de prueba es el mejor para cada persona.</p>

SERVICIOS DE ATENCIÓN PREVENTIVA (recién nacidos, niños, adolescentes y adultos)

Servicio	Población	Resumen
		<p>Los intervalos recomendados* para los exámenes de detección de cáncer colorrectal incluyen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prueba de alta sensibilidad a base de guayaco para detectar sangre oculta en las heces (HSgFOBT) o prueba inmunoenzimática fecal (FIT) cada año. • Prueba de DNA en heces-FIT cada 1 a 3 años. • Colonografía por tomografía computarizada cada 5 años. • Sigmoidoscopia flexible cada 5 años. • Sigmoidoscopia flexible cada 10 años + FIT anual. • Colonoscopia cada 10 años. <p>* IMPORTANTE: Si es necesario realizar una colonoscopia de seguimiento debido a un resultado positivo en un examen de detección no invasivo basado en las heces o en un examen de detección de visualización directa de cáncer colorrectal, la colonoscopia de seguimiento también se considera atención preventiva (cubierta sin costo compartido cuando la realiza un proveedor de la red). Según el USPSTF, la colonoscopia de seguimiento es una parte integral del examen preventivo sin la cual este no sería completo.</p>
Aplicación de flúor en atención primaria (prevención de la caries dental en niños menores de 5 años)	Bebés y niños	<p>Calificación del USPSTF (diciembre de 2021): B El USPSTF recomienda que los médicos de atención primaria apliquen barniz de flúor a los dientes primarios de todos los bebés y niños a partir de la edad de erupción del diente primario.</p> <p>Calificación del USPSTF (diciembre de 2021): B El USPSTF recomienda que los médicos de atención primaria receten suplementos orales con flúor a partir de los 6 meses de edad a los niños cuyo suministro de agua no contenga suficiente flúor.</p>
Ácido fólico para la prevención de los defectos del tubo neural	Mujeres	<p>Calificación del USPSTF (agosto de 2023): A El USPSTF recomienda que todas las personas que planean quedar embarazadas o que puedan hacerlo tomen un suplemento diario que contenga de 0.4 a 0.8 mg (de 400 a 800 µg) de ácido fólico.</p>
Asesoramiento genético y evaluación para la prueba de BRCA y el examen de laboratorio de BRCA	Mujeres	<p>Calificación del USPSTF (agosto de 2019): B El USPSTF recomienda que los médicos de atención primaria evalúen, con una herramienta breve adecuada de evaluación del riesgo familiar, a las mujeres con antecedentes personales o familiares de cáncer de seno, de ovario, de trompas de Falopio o peritoneal, o que tengan ascendencia asociada a mutaciones de los genes de susceptibilidad al cáncer de seno 1 y 2 (BRCA1/2). Las mujeres que tengan un resultado positivo en la herramienta de evaluación del riesgo deben recibir asesoramiento genético y, si se indica después del asesoramiento, pruebas genéticas.</p>

SERVICIOS DE ATENCIÓN PREVENTIVA (recién nacidos, niños, adolescentes y adultos)

Servicio	Población	Resumen
Examen de detección de diabetes gestacional	Mujeres embarazadas	Calificación del USPSTF (agosto de 2021): B El USPSTF recomienda el examen para detectar diabetes mellitus gestacional en personas embarazadas asintomáticas a las 24 semanas de gestación o después.
Examen de detección de gonorrea	Mujeres	Calificación del USPSTF (septiembre de 2021): B El USPSTF recomienda el examen para detectar gonorrea en todas las mujeres sexualmente activas de 24 años o menos y en las mujeres de 25 años o más que presenten un mayor riesgo de infección. Esta recomendación se aplica a personas adolescentes y adultas asintomáticas sexualmente activas, incluidas las personas embarazadas.
Dieta saludable y actividad física para la prevención de enfermedades cardiovasculares en adultos con factores de riesgo cardiovascular: Intervenciones de asesoramiento sobre el comportamiento	Adultos	Calificación del USPSTF (noviembre de 2020): B El USPSTF recomienda ofrecer o remitir a los adultos con factores de riesgo de enfermedad cardiovascular a intervenciones de asesoramiento de salud del comportamiento para promover una dieta saludable y la actividad física.
Peso saludable y aumento de peso durante el embarazo: intervenciones de asesoramiento de salud del comportamiento	Mujeres embarazadas	Calificación del USPSTF (mayo de 2021): B El USPSTF recomienda que los médicos ofrezcan a las personas embarazadas intervenciones eficaces de asesoramiento de salud del comportamiento con el objetivo de promover un aumento de peso saludable y prevenir el aumento excesivo de peso gestacional durante el embarazo.
Examen de detección de la infección por el virus de la hepatitis B	Adolescentes y adultos	Calificación del USPSTF (julio de 2019): A El USPSTF recomienda el examen para detectar infección por el virus de la hepatitis B (HBV) en mujeres embarazadas durante su primera visita prenatal. Calificación del USPSTF (diciembre de 2020): B El USPSTF recomienda el examen para detectar infección por HBV en adolescentes y adultos con alto riesgo de infección.
Examen de detección de la infección por el virus de la hepatitis C	Adultos	Calificación del USPSTF (marzo de 2020): B El USPSTF recomienda el examen para detectar infección por el virus de la hepatitis C en adultos de entre 18 y 79 años.
Examen de detección del virus de inmunodeficiencia humana (HIV)	Adolescentes y adultos	Calificación del USPSTF (junio de 2019): A El USPSTF recomienda que los médicos realicen exámenes de detección de la infección por HIV en los siguientes grupos: <ul style="list-style-type: none"> • Adolescentes y adultos de entre 15 y 65 años. • Los adolescentes más jóvenes y los adultos mayores que tienen un riesgo alto de infección también deben someterse a exámenes de detección. • Todas las personas embarazadas, incluidas aquellas de quienes se desconozca su condición respecto al HIV durante el trabajo de parto o el parto.
Examen de trastornos de hipertensión durante el embarazo	Personas embarazadas	Calificación del USPSTF (septiembre de 2023): B

SERVICIOS DE ATENCIÓN PREVENTIVA (recién nacidos, niños, adolescentes y adultos)

Servicio	Población	Resumen
		El USPSTF recomienda que se examine a las personas embarazadas para detectar trastornos de hipertensión con mediciones de la presión arterial a lo largo del embarazo.
Intervenciones del índice de masa corporal (BMI) elevado en niños y adolescentes	Niños y adolescentes	<p>Calificación del USPSTF (junio de 2024): B El USPSTF recomienda que los médicos proporcionen o remitan a los niños y adolescentes de 6 años o más con un BMI elevado (mayor o igual que el percentil 95 para su edad y sexo) a intervenciones conductuales integrales e intensivas.</p>
Intervenciones para dejar de fumar en adultos, incluidas las personas embarazadas	Adultos	<p>Calificación del USPSTF (enero de 2021): A El USPSTF recomienda que los médicos pregunten a todas las personas embarazadas sobre el consumo de tabaco, les aconsejen que dejen de consumirlo y les ofrezcan intervenciones de salud del comportamiento a las personas embarazadas que consumen tabaco para que dejen de hacerlo.</p> <p>Calificación del USPSTF (enero de 2021): A El USPSTF recomienda que los médicos pregunten a todos los adultos sobre el consumo de tabaco, les aconsejen que dejen de consumirlo y les ofrezcan a las personas adultas no embarazadas que consumen tabaco intervenciones de salud del comportamiento y farmacoterapia aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU. (FDA) para dejar de fumar.</p>
Infección latente de tuberculosis: Examen	Adultos	<p>Calificación del USPSTF (septiembre de 2016): B El USPSTF recomienda el examen para detectar infección latente de tuberculosis (LTBI) en las poblaciones de mayor riesgo. Esta recomendación se aplica a los adultos asintomáticos mayores de 18 años con mayor riesgo de tuberculosis.</p>
Uso de medicamentos para reducir el riesgo de cáncer de seno	Mujeres	<p>Calificación del USPSTF (septiembre de 2019): B El USPSTF recomienda que los médicos ofrezcan recetar medicamentos reductores del riesgo, como tamoxifeno, raloxifeno o inhibidores de la aromatasa, a las mujeres con mayor riesgo de cáncer de seno y bajo riesgo de efectos adversos de los medicamentos.</p>
Profilaxis ocular de la oftalmia gonocócica neonatal	Recién nacidos	<p>Calificación del USPSTF (enero de 2019): A El USPSTF recomienda los medicamentos tópicos oculares profilácticos para todos los recién nacidos con el objetivo de prevenir la oftalmia gonocócica neonatal.</p>
Examen de detección de osteoporosis	Mujeres	<p>Calificación del USPSTF (junio de 2018): B El USPSTF recomienda el examen para detectar osteoporosis con pruebas de medición ósea para prevenir las fracturas osteoporóticas en mujeres a partir de los 65 años.</p> <p>Calificación del USPSTF (junio de 2018): B El USPSTF recomienda el examen para detectar osteoporosis con pruebas de medición ósea para prevenir las fracturas osteoporóticas en mujeres posmenopáusicas menores de 65 años que presenten un riesgo alto de osteoporosis, según</p>

SERVICIOS DE ATENCIÓN PREVENTIVA (recién nacidos, niños, adolescentes y adultos)

Servicio	Población	Resumen
		se determine mediante una herramienta clínica formal de evaluación del riesgo.
Depresión perinatal: intervenciones preventivas (asesoramiento)	Mujeres embarazadas o que han dado a luz recientemente	Calificación del USPSTF (febrero de 2019): B El USPSTF recomienda que los médicos proporcionen intervenciones de asesoramiento a las personas embarazadas o que han dado a luz recientemente que tengan un riesgo alto de depresión perinatal, o las remitan a dichas intervenciones.
Examen de detección de preeclampsia	Mujeres embarazadas	Calificación del USPSTF (abril de 2017): B El USPSTF recomienda que se examine a las mujeres embarazadas para detectar preeclampsia con mediciones de la presión arterial a lo largo del embarazo.
Prevención de caídas en personas mayores que viven en la comunidad	Adultos	Calificación del USPSTF (abril de 2018): B El USPSTF recomienda intervenciones de ejercicio para prevenir las caídas en adultos a partir de los 65 años que viven en la comunidad y presentan un mayor riesgo de caídas.
Prevención de la infección por el virus de inmunodeficiencia humana (HIV): Profilaxis previa a la exposición	Adolescentes y adultos	Calificación del USPSTF (agosto de 2023): A El USPSTF recomienda que los médicos ofrezcan profilaxis previa a la exposición (PrEP) con terapia antirretroviral eficaz a las personas con alto riesgo de contraer HIV. Incluye beneficios relacionados: <ul style="list-style-type: none"> • Pruebas de la función renal (creatinina). • Pruebas serológicas de detección de los virus de la hepatitis B y C. • Pruebas de otras STI. • Pruebas de embarazo cuando sea necesario. • Seguimiento y control continuos, incluidas pruebas de HIV cada 3 meses.
Intervenciones de atención primaria para prevenir el consumo de tabaco en niños y adolescentes	Niños y adolescentes	Calificación del USPSTF (abril de 2020): B El USPSTF recomienda que los médicos de atención primaria ofrezcan intervenciones, incluida la educación o el asesoramiento breve, para prevenir el inicio en el consumo de tabaco entre los niños y los adolescentes en edad escolar. Bright Futures recomienda evaluar el consumo de tabaco entre los 11 y los 21 años.
Intervenciones para apoyar la lactancia	Mujeres embarazadas o que han dado a luz recientemente	Calificación del USPSTF (abril de 2025): B El USPSTF recomienda realizar intervenciones o remisiones durante el embarazo y después del parto para apoyar la lactancia.
Examen de incompatibilidad Rh (D)	Mujeres embarazadas	Calificación del USPSTF (febrero de 2004): A El USPSTF recomienda la determinación del grupo sanguíneo Rh (D) y la prueba de anticuerpos para todas las mujeres embarazadas durante su primera visita para recibir atención relacionada con el embarazo. Calificación del USPSTF (febrero de 2004): B El USPSTF recomienda repetir las pruebas de anticuerpos Rh (D) a todas las mujeres Rh (D) negativo no sensibilizadas

SERVICIOS DE ATENCIÓN PREVENTIVA (recién nacidos, niños, adolescentes y adultos)

Servicio	Población	Resumen
		entre la semana 24 y la semana 28 de gestación, a menos que se sepa que el padre biológico es Rh (D) negativo.
Exámenes e intervenciones de asesoramiento de salud del comportamiento en atención primaria para reducir el consumo no saludable de alcohol en adultos	Adultos	Calificación del USPSTF (noviembre de 2018): B El USPSTF recomienda el examen para detectar el consumo no saludable de alcohol en entornos de atención primaria en adultos a partir de los 18 años, incluidas las mujeres embarazadas, y proporcionar a las personas que consumen alcohol de forma arriesgada o peligrosa intervenciones breves de asesoramiento de salud del comportamiento para reducir el consumo no saludable de alcohol.
Examen de detección de trastornos de ansiedad en adultos	Adultos	Calificación del USPSTF (junio de 2023): B El USPSTF recomienda el examen para detectar trastornos de ansiedad en adultos (menores de 64 años), incluidas las personas embarazadas o que dieron a luz recientemente.
Examen de depresión y riesgo de suicidio en adultos	Adultos	Calificación del USPSTF (junio de 2023): B El USPSTF recomienda el examen para detectar depresión en la población adulta general, incluidas las mujeres embarazadas o que dieron a luz recientemente. El examen debe implementarse con sistemas adecuados que garanticen un diagnóstico preciso, un tratamiento eficaz y un seguimiento apropiado.
Examen de detección de depresión y riesgo de suicidio en niños y adolescentes	Adolescentes	Calificación del USPSTF (octubre de 2022): B El USPSTF recomienda el examen para detectar trastorno depresivo mayor (MDD) en adolescentes de entre 12 y 18 años. El examen debe implementarse con sistemas adecuados que garanticen un diagnóstico preciso, un tratamiento eficaz y un seguimiento apropiado.
Examen de detección de presión arterial alta (hipertensión) en adultos	Adultos	Calificación del USPSTF (abril de 2021): A El USPSTF recomienda el examen para detectar hipertensión en adultos mayores de 18 años a través de la medición de la presión arterial en el consultorio. El USPSTF recomienda obtener mediciones de la presión arterial fuera del entorno clínico para confirmar el diagnóstico antes de iniciar el tratamiento.
Examen de detección de violencia de pareja	Mujeres	Calificación del USPSTF (junio de 2025): B El USPSTF recomienda que los médicos realicen exámenes de detección de violencia de pareja (IPV) en mujeres en edad reproductiva, incluidas aquellas que están embarazadas y en el posparto.
Examen de detección de cáncer de pulmón con tomografía computarizada de baja dosis	Adultos	Calificación del USPSTF (marzo de 2021): B El USPSTF recomienda el examen anual para detectar cáncer de pulmón con tomografía computarizada de baja dosis (LDCT) en adultos de entre 50 y 80 años que tengan un historial de tabaquismo de 20 paquetes por año y fumen actualmente o hayan dejado de fumar en los últimos 15 años. El examen debe interrumpirse una vez que la persona lleve 15 años sin fumar o desarrolle un problema de salud que limite sustancialmente la esperanza de vida o la capacidad o voluntad de someterse a una cirugía de pulmón curativa.

SERVICIOS DE ATENCIÓN PREVENTIVA (recién nacidos, niños, adolescentes y adultos)

Servicio	Población	Resumen
Examen de detección de prediabetes y diabetes de tipo 2	Adultos	<p>Calificación del USPSTF (agosto de 2021): B El USPSTF recomienda el examen para detectar prediabetes y diabetes de tipo 2 en adultos de entre 35 y 70 años con sobrepeso u obesidad. Los médicos deben ofrecer intervenciones preventivas eficaces a los pacientes con prediabetes o remitirlos a dichas intervenciones.</p>
Examen de detección de deficiencias visuales en niños	Niños	<p>Calificación del USPSTF (septiembre de 2017): B El USPSTF recomienda realizar exámenes de la visión al menos una vez a todos los niños de entre 3 y 5 años para detectar ambliopía o sus factores de riesgo.</p>
Examen de detección de sífilis	Adolescentes y adultos	<p>Calificación del USPSTF (mayo de 2025): A El USPSTF recomienda el examen de detección temprana y universal de la infección por sífilis durante el embarazo; si una persona no se realiza el examen al inicio del embarazo, el USPSTF recomienda realizarlo en la primera oportunidad disponible.</p> <p>Calificación del USPSTF (septiembre de 2022): A El USPSTF recomienda el examen para detectar infección por sífilis en personas que tienen un riesgo alto de infección (personas adultas y adolescentes asintomáticas no embarazadas que tienen mayor riesgo de infección por sífilis).</p>
Examen de detección del consumo no saludable de drogas (adultos)	Adultos	<p>Calificación del USPSTF (junio de 2020): B El USPSTF recomienda el examen mediante preguntas acerca del consumo no saludable de drogas en adultos mayores de 18 años. El examen debe implementarse cuando puedan ofrecerse servicios para un diagnóstico preciso, un tratamiento eficaz y una atención adecuada, o remitir al paciente a dichos servicios. (En el examen se hacen preguntas sobre el consumo no saludable de drogas, no se analizan muestras biológicas).</p>
Pérdida de peso para prevenir la morbilidad y mortalidad relacionadas con la obesidad en adultos: intervenciones de salud del comportamiento	Adultos	<p>Calificación del USPSTF (septiembre de 2018): B El USPSTF recomienda que los médicos ofrezcan intervenciones de salud del comportamiento intensivas multicomponentes a los adultos con un índice de masa corporal (BMI) igual o superior a 30 (calculado como el peso en kilogramos dividido por la altura en metros al cuadrado), o los remitan a dichas intervenciones.</p>
Pautas sobre servicios preventivos para la mujer respaldadas por la HRSA		
Examen de detección de cáncer de seno	Mujeres	<p>La WPSI recomienda que las mujeres con riesgo promedio de cáncer de seno comiencen a hacerse mamografías no antes de los 40 años ni después de los 50 años. La mamografía debe realizarse todos los años o, al menos, cada dos años.</p> <p>Las mujeres pueden requerir diagnóstico por imágenes adicional para completar el proceso de detección o para abordar los hallazgos de la mamografía de detección inicial. Si se indica imágenes de diagnóstico adicionales (por</p>

SERVICIOS DE ATENCIÓN PREVENTIVA (recién nacidos, niños, adolescentes y adultos)

Servicio	Población	Resumen
		<p>ejemplo, resonancia magnética, ecografía, mamografía) y evaluación patológica, estos servicios también se recomiendan para completar el proceso de detección de neoplasias malignas. Debe hacerse los exámenes por lo menos hasta los 74 años y no debe interrumpirlos basándose únicamente en la edad.</p> <p>ESPECÍFICO DEL ESTADO: En Arkansas, según la ley estatal, los exámenes de detección de cáncer de seno preventivos incluyen mamografías y ecografías. Además, el costo compartido que se aplica a los exámenes de diagnóstico del cáncer de seno, incluidas las resonancias magnéticas mamarias, las mamografías y las ecografías, no puede ser superior al del examen preventivo. Nota (excepción): En el caso de los planes compatibles con las cuentas de ahorro para la salud (HSA), no se puede renunciar al deducible por los beneficios que superen los requisitos federales de atención preventiva de la ACA. (Consulte la EOC para obtener más información).</p>
Servicios y suministros para la lactancia	Mujeres	<p>La WPSI recomienda servicios integrales de apoyo para la lactancia (incluida la consulta, el asesoramiento, la educación por parte de médicos y servicios de apoyo entre pares, y equipos y suministros para dar el pecho) durante los períodos prenatal, perinatal y posparto para optimizar el inicio y el mantenimiento exitosos de la lactancia.</p> <p>Los equipos y suministros para la lactancia incluyen, entre otros, sacaleches eléctricos dobles (incluidas las piezas y el mantenimiento de los sacaleches) y suministros para el almacenamiento de la leche humana. El acceso a sacaleches eléctricos dobles debe ser una prioridad para que se pueda dar el pecho de una manera más eficaz y no debe depender del fallo previo de un sacaleches manual. El equipo de lactancia también puede incluir equipos y suministros según se indique clínicamente para apoyar a las parejas con dificultades para amamantar y a las que necesiten servicios adicionales.</p>
Anticoncepción	Mujeres	<p>La WPSI recomienda que las mujeres adolescentes y adultas tengan acceso a toda la variedad de anticonceptivos y a la atención anticonceptiva para prevenir embarazos no planificados y mejorar los resultados de los partos. La atención anticonceptiva incluye exámenes, educación, asesoramiento y suministro de anticonceptivos. La atención anticonceptiva también incluye la atención de seguimiento (por ejemplo, administración, evaluación y cambios, incluida la eliminación, la continuación y la interrupción de los anticonceptivos).</p> <p>La WPSI recomienda que toda la variedad de anticonceptivos aprobados, concedidos o autorizados por la FDA, las prácticas eficaces de planificación familiar y los procedimientos de</p>

SERVICIOS DE ATENCIÓN PREVENTIVA (recién nacidos, niños, adolescentes y adultos)

Servicio	Población	Resumen
		<p>esterilización estén disponibles como parte de la atención anticonceptiva. La variedad completa de anticonceptivos incluye los que figuran actualmente en la Guía de métodos anticonceptivos de la FDA: (1) cirugía de esterilización para mujeres, (2) varillas implantables, (3) dispositivos intrauterinos de cobre, (4) dispositivos intrauterinos con progestina (todas las duraciones y dosis), (5) anticonceptivos inyectables, (6) anticonceptivos orales (píldora combinada), (7) anticonceptivos orales (solo progestina), (8) anticonceptivos orales (uso prolongado o continuo), (9) parche anticonceptivo, (10) anillos anticonceptivos vaginales, (11) diafragmas, (12) esponjas anticonceptivas, (13) capuchones cervicales, (14) preservativos, (15) espermicidas, (16) anticoncepción de emergencia (levonorgestrel) y (17) anticoncepción de emergencia (acetato de ulipristal), así como cualquier otro anticonceptivo aprobado, concedido o autorizado por la FDA.</p> <p>Asimismo, a las mujeres que deseen un método alternativo se les debe proporcionar instrucción sobre los métodos basados en el conocimiento de la fertilidad, incluido el método de amenorrea de la lactancia.</p>
Asesoramiento para infecciones de transmisión sexual (STI)	Mujeres	<p>La WPSI recomienda el asesoramiento de salud del comportamiento dirigido por un profesional de la atención de salud u otra persona con la formación adecuada para las mujeres adolescentes y adultas sexualmente activas con mayor riesgo de contraer STI. La WPSI recomienda que los médicos revisen el historial sexual de la mujer y los factores de riesgo para ayudar a identificar a las que tienen un riesgo más alto de contraer STI. Aviso: En el caso de adolescentes y mujeres no identificadas como de alto riesgo, se debe considerar el asesoramiento para reducir el riesgo de STI, según lo determine el criterio clínico.</p>
Prevención de la obesidad en mujeres de mediana edad	Mujeres	<p>La WPSI recomienda asesorar a las mujeres de mediana edad de entre 40 y 60 años que tienen un índice de masa corporal (BMI) normal o con sobrepeso (de 18.5 a 29.9 kg/m²) que mantengan el peso o limiten el aumento de peso para prevenir la obesidad. El asesoramiento puede incluir un análisis individualizado sobre alimentación saludable y actividad física.</p>
Servicios de asesoría para pacientes con cáncer de seno y cáncer cervical	Mujeres	<p>La WPSI recomienda servicios de asesoría para pacientes para los exámenes de detección y el seguimiento del cáncer de seno y el cáncer cervical, según corresponda, para aumentar la utilización de las recomendaciones de detección basadas en una evaluación de las necesidades del paciente en cuanto a servicios de asesoría. Los servicios de asesoría para pacientes incluyen contacto en persona con el paciente (p. ej.: modelos en persona, virtual, híbrido). Los componentes de los servicios de asesoría para pacientes deben ser individualizados. Los servicios incluyen, entre otros, evaluación y planificación</p>

SERVICIOS DE ATENCIÓN PREVENTIVA (recién nacidos, niños, adolescentes y adultos)

Servicio	Población	Resumen
		centradas en la persona, acceso a la atención de salud y utilización del sistema de salud, remisiones a servicios de apoyo adecuados (p. ej., traducción, transporte y servicios sociales) y educación del paciente.
Exámenes de detección y asesoramiento sobre la violencia interpersonal y doméstica	Mujeres	La WPSI recomienda realizar exámenes de detección de violencia interpersonal y doméstica a mujeres adolescentes y adultas al menos una vez al año y, cuando sea necesario, brindarles o remitirlas a servicios de intervención. La violencia interpersonal y doméstica incluye la violencia física, la violencia sexual, el acoso y la agresión psicológica (incluida la coacción), la coacción reproductiva, el abandono y la amenaza de violencia, abuso o ambos. Los servicios de intervención incluyen, entre otros, asesoramiento, educación, estrategias de reducción de daños y remisión a los servicios de apoyo adecuados.
Examen de detección de ansiedad	Mujeres	La WPSI recomienda exámenes de detección de ansiedad en mujeres adolescentes y adultas, incluidas aquellas que están embarazadas o en posparto. Se desconocen los intervalos óptimos del examen y debe usarse el juicio clínico para determinar la frecuencia del examen. Dada la alta prevalencia de trastornos de ansiedad, la falta de reconocimiento en las prácticas clínicas y los múltiples problemas asociados con la ansiedad no tratada, los médicos deberían considerar la posibilidad de que las mujeres que no se hayan realizado el examen recientemente lo hagan.
Examen de detección de cáncer cervical	Mujeres	La WPSI recomienda el examen para detectar cáncer cervical a las mujeres de riesgo medio de entre 21 y 65 años. Para las mujeres de entre 21 y 29 años, se recomienda el examen de detección de cáncer cervical mediante citología cervical (prueba de Papanicolaou) cada 3 años. No se recomienda la prueba conjunta de citología y virus del papiloma humano en mujeres menores de 30 años. Las mujeres de entre 30 y 65 años deben realizarse un examen con citología y pruebas del virus del papiloma humano cada 5 años o solo con citología cada 3 años.
Examen de detección de diabetes después del embarazo	Mujeres	La WPSI recomienda el examen de detección de diabetes de tipo 2 en mujeres con antecedentes de diabetes mellitus gestacional (GDM) que no estén embarazadas en ese momento y a quienes no se les haya diagnosticado diabetes de tipo 2 previamente. Lo ideal es que las pruebas iniciales se realicen durante el primer año posparto y puedan llevarse a cabo a partir de las 4 a 6 semanas posparto. Las mujeres que no se realizaron un examen en el primer año posparto o aquellas con un resultado negativo en el examen posparto inicial deben realizarse el examen al menos cada 3 años durante un mínimo de 10 años después del embarazo. En el caso de las personas que se realizaron el examen en el período posparto temprano y tuvieron un resultado positivo, se deben repetir las pruebas al menos 6 meses después del parto para confirmar el diagnóstico de diabetes,

SERVICIOS DE ATENCIÓN PREVENTIVA (recién nacidos, niños, adolescentes y adultos)

Servicio	Población	Resumen
		independientemente del tipo de prueba inicial (por ejemplo, glucosa plasmática en ayunas, hemoglobina A1c, prueba oral de tolerancia a la glucosa). La repetición de la prueba también se indica para las mujeres que se hicieron la prueba de hemoglobina A1c en los primeros 6 meses posparto, independientemente de si los resultados de la prueba son positivos o negativos, porque la prueba de hemoglobina A1c es menos precisa durante los primeros 6 meses posparto.
Examen de detección de diabetes durante el embarazo	Mujeres	La WPSI recomienda a las mujeres embarazadas realizarse el examen de detección de diabetes mellitus gestacional después de las 24 semanas de gestación (preferiblemente entre las semanas 24 y 28 de gestación) para prevenir resultados adversos en el parto. La WPSI recomienda examinar a las mujeres embarazadas con factores de riesgo de diabetes de tipo 2 o GDM antes de las 24 semanas de gestación, idealmente en la primera visita prenatal.
Examen de detección del virus de inmunodeficiencia humana (HIV)	Mujeres	La WPSI recomienda que todas las mujeres adolescentes y adultas, de 15 años o más, se realicen un examen de detección del virus de inmunodeficiencia humana (HIV) al menos una vez durante su vida. El examen temprano o adicional debe basarse en el riesgo. Además, en el caso de las mujeres adolescentes y adultas con mayor riesgo de infección por HIV, puede ser apropiado volver a realizar el examen anualmente o con mayor frecuencia a partir de los 13 años. La WPSI recomienda la evaluación del riesgo y la educación para prevenir la infección por HIV a partir de los 13 años y de forma continua según el riesgo. Se recomienda a todas las mujeres embarazadas realizarse un examen de detección de HIV al inicio de la atención prenatal y repetir la prueba durante el embarazo según los factores de riesgo. Se recomienda a las mujeres embarazadas que se presenten al parto con una condición respecto al HIV no documentada que se realicen la prueba rápida de HIV.
Examen de detección de incontinencia urinaria	Mujeres	La WPSI recomienda que las mujeres se realicen exámenes de detección de incontinencia urinaria anualmente. El examen debería evaluar si las mujeres tienen incontinencia urinaria y si esta afecta sus actividades y su calidad de vida. La WPSI recomienda remitir a las mujeres para una evaluación y tratamiento adicionales, si se indica.
Exámenes de bienestar para la mujer	Mujeres	La WPSI recomienda que las mujeres asistan al menos a una visita de atención preventiva al año, empezando en la adolescencia y continuando a lo largo de toda la vida, para garantizar que se obtengan todos los servicios preventivos recomendados, incluida la atención previa a la concepción y muchos servicios necesarios para la atención prenatal y durante la concepción. El objetivo principal de estas visitas debe ser la prestación y coordinación de los servicios preventivos recomendados en función de la edad y los factores de riesgo. Estos servicios pueden completarse en una sola visita o como parte de una serie de visitas que

SERVICIOS DE ATENCIÓN PREVENTIVA (recién nacidos, niños, adolescentes y adultos)

Servicio	Población	Resumen
		tienen lugar a lo largo del tiempo para obtener todos los servicios necesarios.
Bright Futures: Recomendaciones para la atención de salud pediátrica preventiva		
Examen de detección de anemia	Niños	Examen de detección de anemia en niños hasta los 22 años.
Examen de detección de depresión	Niños	Examen de detección de depresión en cada una de las visitas recomendadas entre los 12 y los 21 años. Aviso: El examen de detección de depresión materna posparto debe integrarse en las visitas de bienestar para niños a los 1, 2, 4 y 6 meses de edad.
Examen de detección de dislipidemia (evaluación de riesgos/exámenes de laboratorio)	Niños	Evaluación de riesgos recomendada a los 24 meses, 4 años, 6 años, 8 años, 12 años, 13 años, 14 años, 15 años, 16 años. Los exámenes de laboratorio deben realizarse si la evaluación de riesgos es positiva o en los siguientes intervalos: <ul style="list-style-type: none"> • Una vez entre los 9 y los 11 años. • Una vez entre los 17 y los 21 años.
Aplicación de flúor en atención primaria: prevención de la caries dental	Niños	Para quienes tienen riesgo alto, considere aplicar barniz de flúor para la prevención de la caries cada 3 a 6 meses, entre los 6 meses y los 5 años de edad.
Examen formal del desarrollo y el autismo	Niños	Examen hasta los 3 años.
Exámenes de audición	Niños	Exámenes de audición. Se recomienda hacer exámenes de audición a estas edades: recién nacido; entre 3-5 días a 2 meses; 4 años; 5 años, 6 años; 8 años; 10 años; una vez entre los 11 y 14 años; una vez entre los 15 y 17 años; una vez entre los 18 y 21 años; también recomendado para aquellos que tengan una evaluación de riesgo positiva. Se recomienda realizar la evaluación de riesgo a estas edades: 4 meses, 6 meses, 9 meses, 12 meses, 15 meses, 18 meses, 24 meses, 30 meses, 3 años, 7 años y 9 años.
Examen de detección de HIV	Niños	Evaluación de riesgo de HIV: Realizar una evaluación de riesgo a los 11, 12, 13 y 14 años. Análisis de laboratorio para el examen del HIV: Realizar una vez entre los 15 y los 21 años. También se recomienda en cualquier momento entre los 11 y los 14 años cuando la evaluación del riesgo es positiva.
Examen de detección de hipotiroidismo	Recién nacidos	Examen para detectar hipotiroidismo congénito en recién nacidos (de 0 a 90 días).
Examen de detección de plomo en la sangre	Niños	Examen de detección de plomo en la sangre, desde los 6 meses hasta los 7 años de edad.
Examen de detección de fenilcetonuria	Recién nacidos	Examen para detectar fenilcetonuria (PKU) en recién nacidos (de 0 a 90 días).
Evaluación psicosocial o del comportamiento	Niños	Se recomiendan evaluaciones hasta los 22 años.
Examen de detección de deficiencias visuales en niños	Niños	Se recomienda un examen de agudeza visual a los 4 y 5 años, y en niños cooperativos de 3 años. Se recomienda un

SERVICIOS DE ATENCIÓN PREVENTIVA (recién nacidos, niños, adolescentes y adultos)

Servicio	Población	Resumen
		examen ocular instrumental a los 12 y 24 meses de edad, además de las visitas de control entre los 3 y los 5 años.
Infecciones de transmisión sexual (STI)	Niños	Evaluación de riesgo de STI: Realizar una evaluación de riesgo en cada una de las visitas recomendadas entre los 11 y los 21 años. El análisis de laboratorio para detectar STI debe realizarse si la evaluación de riesgo es positiva.
Examen de detección de anemia de células falciformes	Recién nacidos	Examen para detectar anemia de células falciformes en recién nacidos (de 0 a 90 días).
Evaluación del consumo de tabaco, alcohol o drogas	Niños	Evaluaciones recomendadas entre los 11 y los 21 años.
Prueba de tuberculosis	Niños	Se recomienda la prueba hasta los 22 años.

Recomendaciones del ACIP: Vacunas de rutina para niños

Vacuna contra la varicela	Niños	<p>Los médicos recomiendan dos dosis de la vacuna contra la varicela para los niños como la mejor forma de protección contra esta enfermedad.</p> <p>Una dosis a cada una de las siguientes edades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Primera dosis: Entre los 12 y 15 meses. • Segunda dosis: Entre los 4 y 6 años. <p>Los niños mayores o adolescentes también deben recibir dos dosis de la vacuna contra la varicela si nunca recibieron esta vacuna o nunca tuvieron varicela. También deben recibir una segunda vacuna si solo recibieron una vacuna contra la varicela.</p>
Vacuna contra el chikunguña	Niños	El ACIP votó para recomendar la vacuna contra la chikunguña con partículas similares al virus para personas de 12 años o más que viajen a un país o territorio donde hay un brote de chikunguña. Además, la vacuna contra la chikunguña con partículas similares al virus puede considerarse para personas de 12 años o más que se establezcan o viajen (por un período de 6 meses o más) a un país o territorio sin brote pero con riesgo elevado.
Vacuna contra la COVID-19	Niños (a partir de los 6 meses)	Consulte este enlace para obtener más información: https://www.cdc.gov/covid/vaccines/stay-up-to-date.html
Vacuna contra la difteria, tétanos y tos ferina (DTaP)	Niños	<p>Los médicos recomiendan cinco dosis de la vacuna DTaP y una vacuna de refuerzo Tdap para los niños y los preadolescentes como la mejor forma de protección contra la difteria. Aviso: Protege contra la difteria, el tétanos y la tos ferina.</p> <p>Frecuencia recomendada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Primera dosis: A los 2 meses. • Segunda dosis: A los 4 meses. • Tercera dosis: A los 6 meses. • Cuarta dosis: Entre los 15 y 18 meses. • Quinta dosis: Entre los 4 y 6 años.

SERVICIOS DE ATENCIÓN PREVENTIVA (recién nacidos, niños, adolescentes y adultos)

Servicio	Población	Resumen
		<ul style="list-style-type: none"> • Sexta dosis: A los 11 o 12 años (vacuna de refuerzo llamada "Tdap").
Vacuna contra la Haemophilus influenzae tipo b (Hib)	Niños	<p>Los médicos recomiendan tres o cuatro dosis, dependiendo de la marca de la vacuna, para los niños como la mejor forma de protección contra la enfermedad por Hib.</p> <p>Una dosis a cada una de las siguientes edades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Primera dosis: A los 2 meses. • Segunda dosis: A los 4 meses. • Tercera dosis: 6 meses (para algunas marcas). • Cuarta dosis: Entre los 12 y 15 meses.
Vacuna contra la hepatitis A	Niños	<p>Los médicos recomiendan dos dosis de la vacuna contra la hepatitis A para los niños como la mejor forma de protección contra esta enfermedad.</p> <p>Una dosis a cada una de las siguientes edades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Primera dosis: Entre los 12 y 23 meses. • Segunda dosis: 6 meses después de la última dosis.
Vacuna contra la hepatitis B	Niños	<p>Los médicos recomiendan tres dosis de la vacuna contra la hepatitis B para los niños como la mejor forma de protección contra esta enfermedad.</p> <p>Una dosis a cada una de las siguientes edades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Primera dosis: Poco después del nacimiento. • Segunda dosis: Entre los 1 y 2 meses. • Tercera dosis: Entre los 6 y 18 meses.
Vacuna contra el virus del papiloma humano (HPV)	Niños	<p>Se recomienda la vacunación contra el HPV entre los 11 y los 12 años para protegerlos contra los tipos de cáncer causados por la infección por HPV. (Nota: La vacunación puede administrarse a partir de los 9 años en situaciones especiales).</p> <p>Recomendaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entre los 11 y los 12 años: <ul style="list-style-type: none"> ○ Se necesitan dos dosis de la vacuna contra el HPV, con un intervalo de 6 a 12 meses. ○ Si las vacunas se administran con menos de 5 meses de intervalo, es necesaria una tercera dosis. • Si se inicia después de los 15 años: <ul style="list-style-type: none"> ○ Deben administrarse tres dosis de la vacuna contra el HPV a lo largo de 6 meses.
Vacuna contra el poliovirus inactivado	Niños	<p>Los médicos recomiendan cuatro dosis de la vacuna antipoliomielítica para los niños como la mejor forma de protección contra la poliomielitis.</p> <p>Una dosis a cada una de las siguientes edades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Primera dosis: A los 2 meses. • Segunda dosis: A los 4 meses. • Tercera dosis: Entre los 6 y 18 meses. • Cuarta dosis: Entre los 4 y 6 años.

SERVICIOS DE ATENCIÓN PREVENTIVA (recién nacidos, niños, adolescentes y adultos)

Servicio	Población	Resumen
Vacuna contra la influenza (gripe)	Niños	<p>La vacuna anual contra la gripe es la mejor manera de proteger a su hijo de la gripe y de sus complicaciones potencialmente graves.</p> <p>Los médicos recomiendan que los niños se vacunen contra la gripe todos los años en otoño, a partir de los 6 meses. Aviso: Algunos niños (de 6 meses a 8 años de edad) pueden necesitar 2 dosis para obtener la mejor protección.</p>
Vacuna contra el sarampión	Niños	<p>Los proveedores de atención de salud recomiendan dos dosis de la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR) para los niños como la mejor forma de protección contra estas enfermedades.</p> <p>Una dosis a cada una de las siguientes edades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Primera dosis: Entre los 12 y 15 meses. • Segunda dosis: Entre los 4 y 6 años.
Vacuna antimeningocócica	Niños	<p>Dos dosis de la vacuna antimeningocócica denominada MenB-4C (Bexsero) que se administrarán en una serie de 2 dosis a los 0 y 6 meses cuando se administre a adolescentes sanos.</p> <p>Tres dosis de la vacuna antimeningocócica denominada MenB-4C (Bexsero) que se administrarán en una serie de 3 dosis a los 0, 1-2 meses y 6 meses cuando se administre a personas de 10 años o más con mayor riesgo de enfermedad meningocócica del serogrupo B.</p>
Vacuna contra las paperas	Niños	<p>Los médicos recomiendan dos dosis de la vacuna MMR para los niños como la mejor forma de protección contra el sarampión, las paperas y la rubéola.</p> <p>Una dosis a cada una de las siguientes edades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Primera dosis: Entre los 12 y 15 meses. • Segunda dosis: Entre los 4 y 6 años.
Antineumocócica	Niños	<p>Los médicos recomiendan cuatro dosis de la vacuna antineumocócica PCV13 para los niños como la mejor forma de protección contra la enfermedad.</p> <p>Una dosis a cada una de las siguientes edades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Primera dosis: A los 2 meses. • Segunda dosis: A los 4 meses. • Tercera dosis: A los 6 meses. • Cuarta dosis: Entre los 12 y 15 meses.
Vacuna contra la rubéola	Niños	<p>Los médicos recomiendan dos dosis de la vacuna MMR (sarampión, paperas y rubéola) para los niños como la mejor forma de protección contra la rubéola.</p> <p>Una dosis a cada una de las siguientes edades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Primera dosis: Entre los 12 y 15 meses. • Segunda dosis: Entre los 4 y 6 años.

SERVICIOS DE ATENCIÓN PREVENTIVA (recién nacidos, niños, adolescentes y adultos)

Servicio	Población	Resumen
Vacuna contra el rotavirus	Niños	<p>Los médicos recomiendan dos o más dosis de la vacuna contra el rotavirus para los niños como la mejor forma de protección contra este virus.</p> <p>Los bebés deben recibir cualquiera de las dos vacunas contra el rotavirus disponibles:</p> <ul style="list-style-type: none"> • RotaTeq® (RV5) se administra en tres dosis a los 2 meses, 4 meses y 6 meses de edad. • Rotarix® (RV1) se administra en dos dosis a los 2 meses y 4 meses de edad. <p>Aviso: Ambas marcas de vacunas contra el rotavirus se administran por vía oral (gotas), no mediante inyección.</p>
Infección por el virus respiratorio sincitial (RSV)	Niños	<p>Se recomienda que los bebés de 8 meses o menos nacidos durante la temporada del RSV o el inicio y que no están protegidos por la vacunación materna, reciben una dosis de Clesrovimab. No hay una recomendación preferencial entre Nirsevimab y Clesrovimab.</p>
Recomendaciones del ACIP: Vacunas de rutina para adultos		
Vacuna contra la varicela	Adultos	<p>Si usted no es inmune a la varicela (si no tuvo varicela en el pasado o no se vacunó contra esta enfermedad), tiene que recibir 2 dosis de la vacuna con un intervalo de aproximadamente 1 mes.</p>
Vacuna contra el chikunguña	Adultos	<p>El ACIP votó para recomendar la vacuna viva atenuada contra el chikunguña para personas de 18 años o más que viajen a un país o territorio donde hay un brote de chikunguña. Además, la vacuna viva atenuada contra el chikunguña puede considerarse para personas de 18 años o más que se establezcan o viajen (por un período de 6 meses o más) a un país o territorio sin brote pero con riesgo elevado.</p> <p>El ACIP también votó para recomendar la vacuna contra el chikunguña con partículas similares al virus para los trabajadores de laboratorio con potencial de exposición al virus. Se publicará información adicional con la recomendación de brindar orientación a los laboratorios sobre cómo evaluar el riesgo de un trabajador.</p>
Vacuna contra la COVID-19	Adultos	<p>Consulte este enlace para obtener más información: https://www.cdc.gov/covid/vaccines/stay-up-to-date.html</p>
Vacuna contra la difteria	Adultos	<p>Todos los adultos que nunca la hayan recibido deben colocarse la vacuna Tdap. Pueden vacunarse en cualquier momento, independientemente de la última vez que recibieron la vacuna Td. Posteriormente, deben administrarse una vacuna Td o Tdap cada 10 años.</p> <p>Aviso: En la actualidad, las vacunas usadas contra la difteria y el tétanos (es decir, DT y Td) a veces también incluyen protección contra la tos ferina (es decir, DTaP y Tdap). Los bebés y los niños menores de 7 años reciben las vacunas</p>

SERVICIOS DE ATENCIÓN PREVENTIVA (recién nacidos, niños, adolescentes y adultos)

Servicio	Población	Resumen
		DTaP o DT, mientras que los niños mayores y los adultos reciben las Tdap y Td.
Vacuna contra la gripe (influenza)	Adultos	Se recomienda una vez al año.
Vacuna contra la Haemophilus influenzae tipo b (Hib)	Adultos	1 o 3 dosis, según la indicación.
Vacuna contra la hepatitis A	Adultos	<p>Se recomienda para personas con riesgo alto de hepatitis A, personas con riesgo alto de enfermedad grave por hepatitis A, mujeres embarazadas con riesgo de hepatitis A o riesgo de resultado grave a causa de la infección por hepatitis A y cualquier persona que solicite la vacunación.</p> <p>Existen dos tipos de vacuna contra la hepatitis A. El primer tipo, la vacuna contra la hepatitis A de dosis única, se administra en dos inyecciones con seis meses de diferencia, y ambas inyecciones son necesarias para obtener protección a largo plazo contra la hepatitis A. El otro tipo es una vacuna combinada que protege a las personas contra la hepatitis A y la hepatitis B. La vacuna combinada se puede administrar a cualquier persona de 18 años o más y se administra en tres inyecciones durante 6 meses. Las tres inyecciones son necesarias para una protección contra la hepatitis A y la hepatitis B a largo plazo.</p>
Vacuna contra la hepatitis B	Adultos	<p>Se recomienda para adultos de entre 19 y 59 años y adultos mayores de 60 años con factores de riesgo de hepatitis B. Nota: Los adultos de 60 años o más sin factores de riesgo de hepatitis B conocidos también pueden recibir la vacuna contra la hepatitis B.</p>
Vacuna contra el virus del papiloma humano (HPV)	Adultos	<p>Los adolescentes y jóvenes adultos que comienzan la serie más tarde (consulte más arriba el apartado sobre vacunación de niños), entre los 15 y los 26 años, necesitan tres dosis de la vacuna contra el HPV.</p> <p>No se recomienda la vacunación a los mayores de 26 años. Sin embargo, algunos adultos de entre 27 y 45 años que aún no estén vacunados pueden optar por vacunarse contra el HPV después de hablar con su médico sobre el riesgo que corren.</p>
Vacuna contra el sarampión	Adultos	Los adultos que no tengan pruebas presuntivas de inmunidad deben recibir al menos una dosis de la vacuna MMR.
Vacuna antimeningocócica	Adultos	<p>El ACIP recomienda que se utilice la vacuna MenABCWY de GSK cuando tanto MenACWY como MenB estén indicadas en la misma visita.</p> <p>El ACIP recomienda que la vacuna MenB-4C (Bexsero) se administre en una serie de 2 dosis a personas jóvenes saludables de entre 16 y 23 años cuando la toma de</p>

SERVICIOS DE ATENCIÓN PREVENTIVA (recién nacidos, niños, adolescentes y adultos)

Servicio	Población	Resumen
		decisiones clínicas compartida favorece la administración de la vacuna MenB.
La vacuna Mpox (vacuna contra la viruela del mono)	Adultos	El ACIP recomienda la vacunación con una serie de 2 dosis de la vacuna JYNNEOS para las personas de 18 años o más que corran el riesgo de contraer la viruela del mono. La segunda dosis se administra 28 días después de la primera.
Vacuna contra las paperas	Adultos	Los adultos que no tengan pruebas presuntivas de inmunidad deben recibir al menos una dosis de la vacuna MMR.
Vacuna contra la tos ferina	Adultos	<p>Las mujeres embarazadas deben recibir la vacuna Tdap al principio del tercer trimestre de cada embarazo. Además, todos los adultos que nunca la hayan recibido deben colocarse la vacuna Tdap. Pueden vacunarse en cualquier momento, independientemente de la última vez que recibieron la vacuna Td. Posteriormente, deben administrarse una vacuna Td o Tdap cada 10 años.</p> <p>Aviso: En la actualidad, las vacunas usadas contra la difteria y el tétanos (es decir, DT y Td) a veces también incluyen protección contra la tos ferina (es decir, DTaP y Tdap). Los bebés y los niños menores de 7 años reciben las vacunas DTaP o DT, mientras que los niños mayores y los adultos reciben las Tdap y Td.</p>
Antineumocócica	Adultos	<p>Existen dos tipos de vacunas antineumocócicas disponibles en los Estados Unidos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vacunas antineumocócicas conjugadas (PCV15, PCV20 y PCV21). • Vacuna antineumocócica polisacárida (PPSV23). <p>Para quienes nunca hayan recibido ninguna vacuna antineumocócica conjugada, los CDC recomiendan la PCV15, la PCV20 o la PCV21 para adultos de 50 años o más y adultos de entre 19 y 49 años con determinadas condiciones médicas o factores de riesgo. Si se utiliza la PCV15, debe ir seguida de una dosis de PPSV23. Se recomienda la vacuna PPSV23 para adultos mayores de 65 años.</p>
Vacuna contra la rubéola	Adultos	Los adultos que no tengan pruebas presuntivas de inmunidad deben recibir al menos una dosis de la vacuna MMR.
Infección por el virus respiratorio sincitial (RSV)	Adultos	<p>El ACIP recomienda que los adultos de entre 50 y 59 años que corren un mayor riesgo de tener una enfermedad grave por RSV reciban una dosis única de la vacuna contra el RSV.</p> <p>Tenga en cuenta que la vacunación contra el RSV se recomienda solo como una dosis única de por vida. No se recomienda que las personas que ya han recibido la vacuna contra el RSV reciban otra dosis.</p>
Vacuna contra el herpes zóster	Adultos	Los CDC recomiendan que los adultos a partir de los 50 años reciban dos dosis de la vacuna contra el herpes zóster llamada Shingrix (vacuna recombinante contra el zóster).

SERVICIOS DE ATENCIÓN PREVENTIVA (recién nacidos, niños, adolescentes y adultos)

Servicio	Población	Resumen
		<p>para prevenir el herpes zóster y las complicaciones derivadas de la enfermedad. Los adultos a partir de los 19 años que tengan el sistema inmunitario debilitado debido a una enfermedad o a un tratamiento también deben recibir dos dosis de Shingrix, ya que tienen un mayor riesgo de contraer herpes zóster y complicaciones relacionadas.</p> <p>No existe una edad máxima para recibir Shingrix.</p>
Vacuna contra el tétanos	Adultos	<p>Las mujeres embarazadas deben recibir la vacuna Tdap al principio del tercer trimestre de cada embarazo. Todos los adultos que nunca la hayan recibido deben colocarse la vacuna Tdap. Pueden vacunarse en cualquier momento, independientemente de la última vez que recibieron la vacuna Td. Posteriormente, deben administrarse una vacuna Td o Tdap cada 10 años.</p> <p>Aviso: En la actualidad, las vacunas usadas contra la difteria y el tétanos (es decir, DT y Td) a veces también incluyen protección contra la tos ferina (es decir, DTaP y Tdap). Los bebés y los niños menores de 7 años reciben las vacunas DTaP o DT, mientras que los niños mayores y los adultos reciben las Tdap y Td.</p>

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Este documento es una herramienta de referencia y no constituye una garantía de cobertura ni de pago. Los servicios cubiertos solo están disponibles para los miembros elegibles, de acuerdo con las pautas establecidas en la Evidencia de cobertura (EOC) o en la MMEP. Tenga en cuenta que este documento solo incluye los requisitos federales (cobertura nacional de atención preventiva) y no los beneficios requeridos por el estado. *Sin embargo, cubrimos beneficios adicionales de atención preventiva cuando lo exige la ley estatal. Consulte la EOC o la MMEP para obtener más información.*

Ambetter from Arkansas Health & Wellness está cubierto por Celtic Insurance Company (nombre comercial [dba] Arkansas Health and Wellness Insurance Company), QCA Health Plan, Inc., y QualChoice Life & Health Insurance Company, Inc. Estas empresas son emisoras de planes de salud calificados en el Mercado de Seguros de Salud de Arkansas. Esta es una solicitud de seguro. ©2025 Celtic Insurance Company (dba Arkansas Health and Wellness Insurance Company), QCA Health Plan, Inc. y QualChoice Life & Health Insurance Company, Inc., AmbetterHealth.com/es/ar. Si usted o alguien a quien ayuda tiene preguntas sobre Ambetter from Arkansas Health & Wellness y no domina el inglés, tiene derecho a recibir ayuda e información en su idioma sin costo alguno y en el momento oportuno. Si usted o alguien a quien ayuda tiene una condición auditiva o visual que impide la comunicación, tiene derecho a recibir ayudas y servicios auxiliares sin costo y de manera oportuna. Para recibir servicios de traducción o auxiliares, llame a Servicios al Miembro al 1-877-617-0390 (TTY 1-877-617-0392). Para obtener información sobre su derecho a recibir atención del plan de Ambetter from Arkansas Health & Wellness libre de discriminación o sobre su derecho a obtener servicios de idiomas, auditoría o asistencia visual o auditiva, visite AmbetterHealth.com y desplace el cursor hasta el final de la página.

English:

If you, or someone you are helping, have questions about Ambetter from Arkansas Health & Wellness, and are not proficient in English, you have the right to get help and information in your language at no cost and in a timely manner. If you, or someone you are helping, have an auditory and/or visual condition that impedes communication, you have the right to receive auxiliary aids and services at no cost and in a timely manner. To receive translation or auxiliary services, please contact Member Services at 1-877-617-0390 (TTY 1-877-617-0392).

Spanish:

Si usted, o alguien a quien está ayudando, tiene preguntas acerca de Ambetter from Arkansas Health & Wellness y no domina el inglés, tiene derecho a obtener ayuda e información en su idioma sin costo alguno y de manera oportuna. Si usted, o alguien a quien está ayudando, tiene un impedimento auditivo o visual que le dificulta la comunicación, tiene derecho a recibir ayuda y servicios auxiliares sin costo alguno y de manera oportuna. Para recibir servicios auxiliares o de traducción, comuníquese con Servicios para Miembros al 1-877-617-0390 (TTY 1-877-617-0392).

Vietnamese:

Nếu quý vị hoặc người mà quý vị đang giúp đỡ có câu hỏi về Ambetter from Arkansas Health & Wellness và không thành thạo tiếng Anh, quý vị có quyền được trợ giúp và nhận thông tin bằng ngôn ngữ của mình miễn phí và kịp thời. Nếu quý vị hoặc người mà quý vị đang giúp đỡ mắc bệnh về thính giác và/hoặc thị giác gây cản trở giao tiếp, quý vị có quyền được nhận các hỗ trợ và dịch vụ phụ trợ miễn phí và kịp thời. Để nhận dịch vụ thông dịch hoặc dịch vụ phụ trợ, vui lòng liên hệ bộ phận Dịch Vụ Thành Viên theo số 1-877-617-0390 (TTY 1-877-617-0392).

Marshallese:

Ñe kwe, ako juon armij eo kwoj jibañ e, ewōr am kajitok kake Ambetter from Arkansas Health & Wellness, im ejjab eman Kajin Pālle, ewōr am jimwe in bukot jibañ im kōmelele ko ilo kajin eo am ilo ejelok onean im ilo juon ien eo emokaj. Ñe kwe, ako juon armij eo kwoj jibañ e, ewōr am nañinmej eo ilo kōnaan im/ako loelakjān im ej kōmman an ben am kōnaan ippāñ ro jot, ewōr am jimwe in bōk kein jibañ im jerbal ko ilo ejelok onean im ilo juon ien eo emokaj. Ñan bōk jerbal in ukok ako jibañ, jouj topar Jerbal an Ro Uwaan ilo 1-877-617-0390 (TTY 1-877-617-0392).

Chinese:

如果您，或是您正在協助的對象，有關於 Ambetter from Arkansas Health & Wellness 方面的問題，且不精通英語，您有權利免費並及時以您的母語獲幫助和訊息。如果您，或您正在協助的對象有聽力和/或視力上的問題，阻礙了溝通，您有權利免費並及時獲得輔助支援與服務。若要取得翻譯或輔助服務，請聯絡會員服務部，電話是 1-877-617-0390 (TTY 1-877-617-0392)。

Laotian:

ຖ້າຫາກທ່ານ ຫຼື ຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງທີ່ທ່ານກໍາລັງໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ, ມີຄໍາຖາມກ່ຽວກັບ Ambetter from Arkansas Health & Wellness, ແລະ ບໍ່ຊ່ວຍພາສາອັງກິດ, ທ່ານມີສິດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ຂັ້ນທີ່ເປັນພາສາຂອງທ່ານໄດ້ຍື່ນຕົ້ນໄຊ້ຈ່າຍ ແລະ ທັນເວລາ. ຖ້າຫາກທ່ານ ຫຼື ຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງທີ່ທ່ານກໍາລັງໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ, ມີສະພາບຫາງການໄດ້ຍືນ ແລະ/ຫຼື ການປ່ຽງເຫັນທີ່ຂັດຂາງການສໍາສານ, ທ່ານມີສິດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ການບໍລິການເສີມຄົດຍື່ນຕົ້ນໄຊ້ຈ່າຍ ແລະ ທັນເວລາ. ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການບໍລິການແປ່ງໆສໍາ ຫຼື ບໍລິການສົນ, ກະລຸນາໂຄດຕໍ່ຫາ Member Services (ການບໍລິການສະມາຊຸກ) ໄດ້ທີ່ 1-877-617-0390 (TTY 1-877-617-0392).

Tagalog:

Kung ikaw, o ang iyong tinutulungan, ay may mga katanungan tungkol sa Ambetter from Arkansas Health & Wellness, at hindi ka mahusay sa Ingles, may karapatan ka na makakuha ng tulong at impormasyon sa iyong wika nang walang gastos at sa maagap na paraan. Kung ikaw, o ang iyong tinutulungan, ay may kondisyon sa pandinig at/o pannikin na nakakaapekto sa komunikasyon, may karapatan kang makatanggap ng mga karagdagang tulong at serbisyo nang walang gastos at sa maagap na paraan. Para makatanggap ng mga serbisyo sa pagasalin o mga karagdagang serbisyo, mangyaring makipag-ugnayan sa Mga Serbisyo para sa Miyembro sa 1-877-617-0390 (TTY 1-877-617-0392).

Arabic:

إذا كان لديك أو لدى شخص تساعدك حول Ambetter from Arkansas Health & Wellness، ولم تكن بارعاً باللغة الإنكليزية، فلديك الحق في الحصول على المساعدة والمعلومات بلغتك من دون أي تكلفة وفي الوقت المناسب. إذا كنت أنت أو أي شخص تساعدك تعانى من حالة سمعية و/أو بصرية تعيق التواصل، فلديك الحق في تلقى مساعدات وخدمات إضافية من دون أي تكلفة وفي الوقت المناسب. لتلقى خدمات الترجمة أو خدمات إضافية، يرجى الاتصال بخدمات الأعضاء على (1-877-617-0390 (TTY 1-877-617-0392).

German:

Falls Sie oder jemand, dem Sie helfen, Fragen zu Ambetter from Arkansas Health & Wellness hat und nicht Englisch spricht, haben Sie das Recht, kostenlos und zeitnah Hilfe und Informationen in Ihrer Sprache zu erhalten. Falls Sie oder jemand, dem Sie helfen, eine Hör- und/oder Sehbeeinträchtigung hat, die die Kommunikation beeinflusst, haben Sie das Recht, kostenlos und zeitnah zusätzliche Hilfe und Dienstleistungen zu erhalten. Um eine Übersetzung oder zusätzliche Dienstleistungen zu erhalten, wenden Sie sich an den Kundendienst unter 1-877-617-0390 (TTY 1-877-617-0392).

French:

Si vous-même ou une personne que vous aidez avez des questions à propos d'Ambetter from Arkansas Health & Wellness et que vous ne maîtrisez pas l'anglais, vous pouvez bénéficier gratuitement et en temps utile d'aide et d'informations dans votre langue. Si vous-même ou une personne que vous aidez souffrez d'un trouble auditif ou visuel qui entrave la communication, vous pouvez bénéficier gratuitement et en temps utile d'aides et de services auxiliaires. Pour profiter de services de traduction ou de services auxiliaires, veuillez contacter Services aux membres au 1-877-617-0390 (TTY 1-877-617-0392).

Hmong:

Yog tias koj, los sis ib tug neeg twg uas koj tab tom muab kev pab, muaj cov lus nug hais txog Ambetter from Arkansas Health & Wellness, thiab tsis paub lus Askiv zoo heev, koj muaj cai tau txais kev pab thiab tej ntaub ntawv qhia paub ua koj hom lus yam tsis tau them dab tsi li thiab kom tau raws sij hawm. Yog tias koj, los sis ib tug neeg twg uas koj tab tom pab, muaj tsos mob txog kev hnov lus thiab/los sis kev pom kev uas cuam tshuam txog kev sib txuas lus, koj muaj cai kom tau txais cov kev pab thiab cov kev pab cuam ntxiv yam tsis tau them dab tsi li thiab kom tau raws sij hawm. Txhawm rau kom tau txais cov kev pab cuam txhais ntawv los sis kev pab ntxiv, thov tiv tauj Member Services (Cov Chaw Muab Kev Pab Cuam Tswv Cuab) tau ntawm 1-877-617-0390 (TTY 1-877-617-0392).

Korean:

귀하 또는 귀하의 도움을 받는 분이 Ambetter from Arkansas Health & Wellness에 대한 질문이 있는 경우 영어에 능숙하지 않으시면 해당 언어로 시의적절하게 무료 지원과 정보를 받을 권리가 있습니다. 귀하 또는 귀하의 도움을 받는 분이 청각 및/또는 시각적으로 의사소통에 장애가 있는 경우 시의적절하게 무료 보조 도구 및 서비스를 받을 권리가 있습니다. 번역 또는 보조 서비스를 받으시려면 1-877-617-0390(TTY 1-877-617-0392)번으로 가입자 서비스부에 연락해주십시오.

Portuguese:

Se tiver dúvidas acerca da Ambetter from Arkansas Health & Wellness, ou estiver a ajudar uma pessoa com dúvidas acerca desta, e não dominar o inglês, tem o direito de obter ajuda e informações no seu idioma sem qualquer custo e de forma atempada. Se tiver uma condição visual e/ou auditiva que dificulte a comunicação ou estiver a ajudar uma pessoa com uma condição deste tipo, tem o direito de receber equipamentos ou serviços de assistência sem qualquer custo e de forma atempada. Para receber traduções ou serviços de assistência, contacte serviços de membro através do número 1-877-617-0390 (TTY 1-877-617-0392).

Japanese:

ご自身やあなたが介護している他の人が、Ambetter from Arkansas Health & Wellnessについてご質問をお持ちの場合、英語に自信がなくても無料かつタイムリーにご希望の言語でヘルプや情報を得ることができます。ご自身や、あなたが介護している他の人の聴覚や視覚の状態のためやり取りが難しい場合でも、無料かつタイムリーに補助サービスを受けることができます。翻訳や補助サービスを受けるには、1-877-617-0390 (TTY 1-877-617-0392)のメンバーサービスにご連絡ください。

Hindi:

अगर आप या कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी आप सहायता कर रहे हैं, के पास Ambetter from Arkansas Health & Wellness से जुड़े प्रश्न हैं और आप दोनों अंग्रेज़ी में माहिर नहीं हैं, तो आपको अपनी भाषा में मुफ्त और समय पर सहायता और जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। अगर आपको या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसकी आप मदद कर रहे हैं, सुनने और/या देखने में समस्या होती है और इससे बातचीत बाधित होती है, तो आपको बिना किसी लागत के और समय पर सहायक सहायता और सेवाएं प्राप्त करने का अधिकार है। अनुवाद या सहायक सेवाएं प्राप्त करने के लिए कृपया 1-877-617-0390 (TTY 1-877-617-0392) पर सदस्य सेवाएं से संपर्क करें।

Gujarati:

જો તમને અથવા તમે જેમની મદદ કરી રહ્યા હો એવી કોઈ વ્યક્તિને Ambetter from Arkansas Health & Wellness વિશે પ્રશ્નો હોય અને અંગ્રેજીમાં પ્રવીણ ન હોય, તો તમને કોઈ ખર્ચ કર્યા વિના અને સમયસર તમારી ભાષામાં મદદ તથા માહિતી મેળવવાનો અધિકાર છે. જો તમે અથવા તમે જેમની મદદ કરી રહ્યા હો એવી કોઈ વ્યક્તિ શ્રવણશક્તિ અને/અથવા દૃષ્ટિવિષયક અવસ્થાથી પીડિત હોય કે જે સંચારને અવરોધતી હોય, તો તમને કોઈ ખર્ચ કર્યા વિના અને સમયસર સહાયક સહાય તથા સેવાઓ પ્રાપ્ત કરવાનો અધિકાર છે. અનુવાદ અથવા સહાયક સેવાઓ પ્રાપ્ત કરવા માટે, કૃપા કરીને 1-877-617-0390 (TTY 1-877-617-0392) પર સભ્યની સેવાઓનો સંપર્ક કરો।
